



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การปฏิบัติกรพยาบาลส่วนล้าง
กระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ
ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก



ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอรภาส สายสิทธิ์
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University



1

ระยะเตรียมการสวน
ล้างกระเพาะปัสสาวะ


2

ระยะปฏิบัติการ
พยาบาลสวนล้าง
กระเพาะปัสสาวะ

3

ระยะประเมินผลการ
พยาบาลสวนล้าง
กระเพาะปัสสาวะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้






PROSTATE CANCER

NORMAL PROSTATE

PROSTATE CANCER






Step 1

ระยะเตรียมการ



Step 2

ระยะปฏิบัติการ



Step 3

ระยะประเมินผล




Step 1

ระยะเตรียมการ




Step 2

ระยะปฏิบัติการ




ปรับอัตราหยดของสารน้ำตามแผนการรักษา หรือตามลักษณะของปัสสาวะที่ออกมา เช่น ไนเตรดที่ 1 ภายใน 8 ชั่วโมงแรก ให้ปรับอัตราหยดที่ 40-50 หยดต่อนาที หรือ 160-200 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นไนเตรดต่อมาให้ปรับตามสีของน้ำปัสสาวะ





Step 3

ระยะประเมินผล



ติดตามผลการให้การพยาบาลรวมถึง
การบันทึกการพยาบาลเพื่อเป็นข้อมูลใน
การดูแลรักษาต่อไป เช่น อาการปวด
ท้อง ท้องน้อยโป่งตึง ร่วมกับปัสสาวะ
ออกลงมาในถุงปัสสาวะลดลงหรือไม่ออก
เลย ปริมาณปัสสาวะที่ออก ปริมาณสาร
น้ำที่เข้าร่างกาย



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม